

入院患者の転倒・転落発生率(a)

- 分子
 - a. 医療安全管理室へインシデント・アクシデントレポートが提出された入院中の転倒・転落件数
 - 包含
 - 介助時の転倒・転落、複数回の転倒・転落
 - 除外
 - 訪問者、学生、スタッフなど入院患者以外の転倒・転落
- 分母
 - 入院延べ患者数(人日)
- 単位
 - %: パーミル ($\times 1000$)

入院患者の転倒・転落による損傷発生率 (b) (c)

- 分子
 - b. 医療安全管理室へインシデント・アクシデントレポートが提出された転倒・転落件数のうち**損傷レベル2以上*** の転倒・転落件数
 - c. 医療安全管理室へインシデント・アクシデントレポートが提出された転倒・転落件数のうち**損傷レベル4以上*** の転倒・転落件数
 - 包含
 - 介助時の転倒・転落、複数回の転倒・転落
 - 除外
 - 訪問者、学生、スタッフなど入院患者以外の転倒・転落
- 分母
 - 入院延べ患者数(人日)
- 単位
 - %: パーミル ($\times 1000$)

* 別紙「転倒による損傷レベル」参照

転倒による損傷のレベル

レベル		説明
1	なし	患者に損傷はなかった
2	軽度	包帯、氷、創傷洗浄、四肢の拳上、局所薬が必要となった、あざ・擦り傷を招いた
3	中軽度	縫合、ステリー・皮膚接着剤、副子が必要となった、または筋肉・関節の挫傷を招いた
4	重度	手術、ギプス、牽引、骨折を招いた・必要となった、または神経損傷・身体内部の損傷のため診察が必要となった
5	死亡	転倒による損傷の結果、患者が死亡した
6	UTD	記録からは判定不可能

- ① 最初の転倒・転落報告が記載される時には、損傷の程度がまだ不明かもしれない。転倒24時間後の患者の状態をフォローアップする方法を決める必要がある。
- ② 患者が転倒24時間以内に退院する場合は、退院時の損傷レベルを判断する。
- ③ X線、CTスキャン、またはその他の放射線学的評価により損傷の所見がなく、治療もなく、損傷の兆候及び症状もない場合は、“1なし”を選択する。
- ④ 凝固障害のある患者で、転倒の結果血液製剤を受ける場合は、“4重度”を選択する。

算出例

	調査期間外	調査期間(10/1~10/31)	調査期間外	分母	分子
入院日が調査期間外で退院日が調査期間内になる場合 調査期間内の入院日数を対象とする	9/15入院 	10/1退院		1	0
	3/1日入院 	10/10退院		10	1
入院日が調査期間内で退院日が調査期間外になる場合 調査期間内の入院日数を対象とする			10/29入院 	3	0
		10/3入院 	11/20入院中	29	3
調査期間に複数回入院がある場合 複数回の入院日数を合計する		10/2入院 , 10/13入院 , 10/25入院 	10/5退院 10/18退院 10/28退院	14	4
入院日が調査期間外で退院日も調査期間外になる場合 調査期間内の入院日数を対象とする	8/25入院 		11/10退院	31	0



調査期間内の入院日数と転倒・転落件数を対象

11月以降の対象

分子のカウントについて

- 1件の事象に複数のレポートが提出された場合
 - 1件とカウント
- 同じ患者が複数回転倒した場合
 - 例：10月に2回転倒した場合は2件とカウント
 - 例：10月に1回、11月に1回転倒した場合は、10月に1件、11月に1件とカウント
- 敷地外で1回転倒した場合
 - 入院中の患者で、敷地を問わずインシデント・アクシデントレポートが提出されている場合は1件とカウント

Fall Injury Level

The patient's condition after 24 hours from the fall.

1 None –patient had no injuries

2 Minor –resulted in application of a dressing, ice, cleaning of a wound, limb elevation, topical medication, bruise or abrasion

3 Moderate –resulted in suturing, application of steristrips/skin glue, splinting, or muscle or joint strain

4 Major –resulted in surgery, casting, traction, fracture, or required consultation for neurological or internal injury

5 Death –the patient died as a result of injuries sustained from the fall

6 UTD –Unable to Determine from the documentation

When the initial fall report is written by the nursing staff, the extent of the injury may not yet be known. A method to follow up on the patient's condition after 24 hours from the fall must be established.

- When the patient is discharged within 24 hours from the fall determine injury level at the time of discharge.
- X-ray, CT scan or other radiological evaluation resulting in a finding of no injury, with no treatment and no signs or symptoms of injury–select “1 None”.
- Patients with coagulopathy who receive blood products as a result of a fall –select “4 Major”.